

ERRATA CORRIGE

G Ital Cardiol 2023;24(10):849

Errata corrige relativa al lavoro "Position paper ANMCO in collaborazione con ITACARE-P: Terapia anti-ischemica nei pazienti con sindrome coronarica cronica" [G Ital Cardiol 2023;24(7):571-580]. doi: 10.1714/4060.40436

Gli Autori segnalano un errore in Tabella 2 relativo al dosaggio del bisoprololo. Si riporta la Tabella 2 corretta:

Tabella 2. Caratteristiche dei principali betabloccanti utilizzati nella cardiopatia ischemica cronica.

Agente	Azione recettoriale	Dosaggio di mantenimento	Rapporto di potenza	ISA	Emivita (h)
Bisoprololo	B1	5-10 mg/die	10	0	7-15
Metoprololo*	B1	200 mg/die	1	0	3-5
Atenololo	B1	50-100 mg/die	1	0	6-9
Carvedilolo	B1/B2/A1	3.125-50 mg bid	10	0	6-10
Nebivololo	B1 + NO	5-10 mg/die	10	0	10
Labetalolo	B1/B2/A1	100-400 mg bid	0.3	0	6
Propranololo	B1/B2	80-320 mg bid	1	0	3-5
Acebutololo	B1	200-600 mg bid	0.3	+	3-4
Nadololo	B1/B2	40-80 mg/die	1	0	14-25

ISA, attività simpaticomimetica intrinseca; NO, ossido nitrico.

Rapporto di potenza relativo rispetto al propranololo.

*Tartarato.